

VIII. ULUSAL MATEMATİK OLİMPİYATI-2000

B

Metin içinde kullanılan bazı gösterimlerin anımları aşağıda verilmiştir.

AB	A ve B noktalarından geçen doğru
$[AB]$	A ve B noktalarını birleştiren doğru parçası
$ AB $	$[AB]$ ının uzunluğu
$m(\hat{A})$	A açısının ölçüsü
$m(\widehat{ABC})$	ABC açısının ölçüsü
\mathbb{R}	Gerçel sayılar kümesi

1. Bir ABC üçgeninde $[BD]$ kenarortay, $m(\widehat{ABD}) = 90^\circ$, $|AB| = 2$ ve $|AC| = 6$ ise, $|BC|$ nedir?

- a) $2\sqrt{6}$ b) $4\sqrt{2}$ c) 5 d) $3\sqrt{2}$ e) 3

2. $\sqrt{17p + 625}$ sayısının bir tam sayı olmasını sağlayan en büyük p asal sayısı nedir?

- a) 211 b) 151 c) 101 d) 67 e) 3

3. A, B, C, D ve E den bazıları doğrucu, bazıları da yalancıdır. Doğruların her söylediği doğru; yalancıların ise, her söylediği yalandır. A nin doğruluğunu ve diğerlerinin de aşağıdaki önermeleri söylediğini biliyoruz:

B : Ben doğrucuyum.

C : D , doğrucudur.

D : B ve E nin ikisi birden doğruluğu değildir.

E : A ve B doğrucudur.

Bu toplulukta toplam doğruluğu sayısı nedir?

- a) 4 b) 3 c) 2 d) 1 e) Veriler yetersizdir

4. $(x + y)^5 = z$

$(y + z)^5 = x$

$(z + x)^5 = y$

sistemini sağlayan kaç (x, y, z) gerçek sayı sıralı üçlüsü vardır?

- a) 3 b) 2 c) 1 d) Sonsuz çoklukta e) Hiçbiri

5. Alanı a olan bir dik üçgenin iç teğet çemberi ile, alanı b olan bir dik üçgenin çevrel çemberi aynı çember ise, $\frac{a}{b}$ en az nedir?

- a) $2\sqrt{3}$ b) $2 + \sqrt{3}$ c) $2\sqrt{2}$ d) $1 + \sqrt{2}$ e) $3 + 2\sqrt{2}$

6. Aşağıdakilerden hangisi tam sayı katsayılı ikinci dereceden bir polinomun diskriminantı olamaz?

- a) 33 b) 28 c) 25 d) 24 e) 23

7. $0, 1, 2, \dots, 9$ sayılarını, tek sayılar kendi içlerinde, çift sayılar da yine kendi içlerinde artan olmak koşuluyla, kaç değişik biçimde sıralayabiliriz?

- a) 315 b) 252 c) 189 d) 126 e) Hiçbiri

8. $(x\sqrt{x})^x = x^{x\sqrt{x}}$ denkleminin gerçek çözümlerinin toplamı nedir?

- a) $\frac{13}{4}$ b) $\frac{24}{19}$ c) $\frac{9}{4}$ d) $\frac{71}{4}$ e) $\frac{18}{7}$

9. Birbirine dıştan teğet olan k_1 ve k_2 çemberlerinin ortak dış teğet doğrularından biri d olsun. d nin k_1 çemberine değdiği noktası A , k_1 çemberinin A dan geçen çapı $[AB]$, B noktasından k_2 çemberine çizilen teğetin değme noktası C ile gösterilmek üzere, $|AB| = 8$ ve k_2 çemberinin çapı 7 ise, $|BC|$ nedir?

- a) $5\sqrt{3}$ b) 8 c) 10 d) $6\sqrt{2}$ e) 7

10. $9^{8^7}^2$ sayısının on tabanına göre yazılımının son iki basamağı nedir?

- a) 01 b) 21 c) 41 d) 61 e) 81

11. A, B ve C , aralarında tavla oynarlar. Önce A ile B karşılaşır, kazanan C ile oynar. Bundan sonra, parti devam ettiği sürece, oynanan son oyunu kazanan, o karşılaşmadan oynamayan üçüncü kişi ile karşılaşır. Oyunculardan biri art arda iki kez kazanınca, parti sona erer ve ardışık iki oyunu kazanan partinin galibi olur. Her oyunda iki tarafın da kazanma olasılığı eşit ise, C nin partiyi kazanma olasılığı nedir?

- a) $\frac{1}{7}$ b) $\frac{3}{14}$ c) $\frac{1}{3}$ d) $\frac{2}{7}$ e) Hiçbiri

12. $(2 + (2 + (2 + x)^2)^2)^2 = 2000$ denkleminin gerçek kökleri toplamı nedir?

- a) 4 b) 2 c) 0 d) -2 e) -4

- 13.** $ABCDE$ dışbükey beşgeninde $m(\hat{B}) = m(\hat{D}) = 90^\circ$, $m(\hat{C}) = 120^\circ$, $|AB| = 2$, $|BC| = |CD| = \sqrt{3}$ ve $|ED| = 1$ olduğuna göre, $|AE|$ nedir?
- a) $\sqrt{3}$ b) $\sqrt{3} - 1$ c) $\frac{3}{2}$ d) $\frac{2\sqrt{3}}{3}$ e) $\frac{3\sqrt{3}}{2}$
- 14.** On tabanına göre yazılımı 50 basamaklı olan bir N tam sayısının soldan 26. basamağı dışındaki bütün basamaklarında 1 rakamı bulunuyor ve N , 13 ile bölünüyorsa, N nin yazılımında soldan 26. rakam nedir?
- a) 8 b) 6 c) 3 d) 1 e) Veriler yetersizdir
- 15.** 7 kırmızı, 7 beyaz topu, her kutuda tam olarak 2 top olması koşuluyla, 7 kutuya kaç değişik biçimde dağıtabiliriz?
- a) 1716 b) 858 c) 393 d) 163 e) Hiçbiri
- 16.** (a_n) dizisi, $a_1 = 1$ ve her $n \geq 2$ pozitif tam sayısı için $|a_n| = |a_{n-1} + 2|$ koşullarını sağlıyorsa, $\sum_{i=1}^{2000} a_i$ toplamının alabileceği en küçük değer nedir?
- a) -1000 b) -2000 c) -3000 d) -4000 e) Hiçbiri

17. Bir $ABCD$ dışbükey kirişler dörtgeninde $m(\widehat{ACB}) = 90^\circ$, $m(\widehat{ABD}) = 45^\circ$, $|AB| = 26$ ve $|BC| = 10$ ise, DAC üçgeninin alanı nedir?

- a) 80 b) 84 c) 90 d) 108 e) 120

18.

$$\begin{aligned}3x^2 - 2y^2 - 4z^2 + 54 &= 0 \\5x^2 - 3y^2 - 7z^2 + 74 &= 0\end{aligned}$$

sisteminin sağlayan kaç (x, y, z) pozitif tam sayı sıralı üçlüsü vardır?

- a) 3 b) 2 c) 0 d) Sonsuz çoklukta e) Hiçbiri

19. 20 kişilik bir komite, A, B, C adayları arasından bir seçim yapmak için değişik türden bir oylamaya başvurur. Her komite üyesi, adaylara ilişkin tercih sıralamasını, herhangi iki aday arasında çekimser kalmaksızın, oy pusulasına yazar. (Örneğin, pusulaya BAC yazan üye, B yi A ya ve C ye; A yi da C ye tercih ediyor demektir.) Oy pusulaları açılınca, üç adayın altı değişik sıralanışından her birinin en az bir pusulada geçtiği ve tam olarak 11 üyenin A yi B ye; 12 üyenin C yi A ya; 14 üyenin de B yi C ye tercih ettiği görülür. Kaç komite üyesinin birinci tercihi B dir?

- a) 10 b) 8 c) 7 d) 5 e) Veriler yetersizdir

20. a, b, c, d, e negatif olmayan gerçel sayılar ve $a + b + c + d + e > 0$ olmak üzere, $a + c = tb$, $b + d = tc$, $c + e = td$ koşullarını sağlayan en küçük gerçel t sayısı nedir?

- a) 2 b) $\frac{3}{2}$ c) $\sqrt{2}$ d) 1 e) $\frac{\sqrt{2}}{2}$

21. Kenar uzunlukları $1, 4, 7, 8$ olan bir dörtgenin alanı en çok kaç olabilir?

- a) $9\sqrt{5}$ b) $12\sqrt{3}$ c) 18 d) $10\sqrt{3}$ e) $7\sqrt{2}$

22. $1 + 2 + 2^2 + 2^3 + \cdots + 2^n$ toplamının 77 ile bölünmesini sağlayan en küçük $n \geq 100$ tam sayısı nedir?

- a) 119 b) 111 c) 105 d) 101 e) Hiçbiri

23. Kenar uzunlukları 3, 7 ve 8 olan bir üçgenin içinde gelişigüzel alınan bir noktadan, köşelerden en az birine olan uzaklığın 1 den küçük olması olasılığı nedir?

- a) $\frac{3}{4}$ b) $\frac{1}{2}$ c) $\frac{\pi}{36}$ d) $\frac{\pi}{36}\sqrt{3}$ e) $\frac{\pi}{36}\sqrt{2}$

24. $p(x)$ tüm kökleri gerçel olan ve her x gerçel sayısı için $p(x^2 - 1) = p(x)p(-x)$ eşitliğini sağlayan bir polinom ise, $p(x)$ in derecesi en fazla kaç olabilir?

- a) 4 b) 2 c) 0 d) $p(x)$ in derecesi için üst sınır yoktur. e) Hiçbiri

25. O_1 ve O_2 merkezli birbirine dıştan teğet iki çemberin ortak dış teğet doğrularından biri çemberlere sırasıyla B ve C noktalarında değiyor. Çemberlerin ortak noktası A olmak üzere BA doğrusu O_2 merkezli çemberi A ve D noktalarında kesiyor. $|BA| = 5$ ve $|AD| = 4$ ise $|CD|$ nedir?

- a) $4\sqrt{5}$ b) $\frac{15}{2}$ c) 6 d) $\sqrt{27}$ e) $\sqrt{20}$

26. $0 \leq x, y < 31$ olmak üzere, $(x^2 - 18)^2 \equiv y^2 \pmod{31}$ denkliğini sağlayan kaç (x, y) tam sayı sıralı ikilisi vardır?

- a) 62 b) 61 c) 60 d) 59 e) Hiçbiri

27. Tüm basamaklarındaki rakamlar birbirinden farklı olan ve 11111 ile bölünen on basamaklı kaç tam sayı vardır?

- a) 11111 b) 3456 c) 2842 d) 1264 e) 0

28. Tüm x, y pozitif gerçel sayıları için

$$f(x)f(y) - f(xy) = \frac{y}{x} + \frac{x}{y}$$

koşulunu sağlayan f fonksiyonlarının alabileceği farklı $f(2)$ değerlerinin toplamı nedir?

- a) $\frac{3}{2}$ b) $\frac{5}{4}$ c) $-\frac{5}{4}$ d) $\frac{5}{2}$ e) Hiçbiri

29. Alanı 18 olan bir $ABCD$ dışbükey dörtgeninde, $|AB| + |BD| + |DC| = 12$ ise, $|AC|$ nedir?

- a) $6\sqrt{2}$ b) 6 c) 8 d) $6\sqrt{3}$ e) 9

30. $f(x) = x^3 + 7x^2 + 9x + 10$ ise,

$$f(a) \equiv f(b) \pmod{p} \Rightarrow a \equiv b \pmod{p}$$

gerektilmesinin tüm a, b tam sayıları için doğru olmasını p nin aşağıdaki değerlerinden hangisi sağlar?

- a) 17 b) 13 c) 11 d) 7 e) 5

31. $\{1, 2, 3, 4, 5\}$ kümesinin, her $1 \leq k \leq 4$ için $(\alpha_1 \cdots \alpha_k)$, $\{1, \dots, k\}$ kümesinin bir permütasyonu olmayacak şekilde, kaç değişik $(\alpha_1 \alpha_2 \alpha_3 \alpha_4 \alpha_5)$ permütasyonu vardır?

- a) 461 b) 71 c) 65 d) 13 e) Hiçbiri

32. $f_1(x) = x^2 + x$ $f_2(x) = 2x^2 - x$ $f_3(x) = x^2 + x$
 $g_1(x) = x - 2$ $g_2(x) = 2x$ $g_3(x) = x + 2$

olmak üzere, fonksiyonlar üzerinde tanımlı toplama, çıkarma ve çarpma işlemleri kullanılarak, $i \in \{1, 2, 3\}$ olmak üzere f_i ve g_i fonksiyonlarından $h(x) = x$ fonksiyonu elde edilebiliyorsa, $F_i = 1$; aksi halde $F_i = 0$ olarak tanımlanıyor. (F_1, F_2, F_3) nedir?

- a) $(0, 1, 1)$ b) $(0, 1, 0)$ c) $(0, 0, 1)$ d) $(0, 0, 0)$ e) Hiçbiri

33. Bir $ABCD$ karesinin $[AB]$ kenarı üzerinde bir K noktası, $[BC]$ kenarı üzerinde bir L noktası alınıyor. $|AK| = 3$, $|KB| = 2$ ve K nin DL doğrusuna uzaklığı 3 ise, $|BL| : |LC|$ nedir?

- a) $\frac{\sqrt{2}}{2}$ b) $\frac{3}{8}$ c) $\frac{8}{7}$ d) $\frac{\sqrt{3}}{2}$ e) $\frac{7}{8}$

34. Aşağıdaki önermelerden hangisi, en az bir p asal sayısı için doğru değildir?

- a) $x^2 + x + 25 \equiv 0 \pmod{p}$ denkliğinin çözümü yoksa,
 $x^2 + x + 3 \equiv 0 \pmod{p}$ denkliğinin de çözümü yoktur.
- b) $x^2 + x + 25 \equiv 0 \pmod{p}$ denkliğinin çözümü varsa,
 $x^2 + x + 3 \equiv 0 \pmod{p}$ denkliğinin de çözümü vardır.
- c) $x^2 + x + 3 \equiv 0 \pmod{p}$ denkliğinin çözümü yoksa,
 $x^2 + x + 25 \equiv 0 \pmod{p}$ denkliğinin de çözümü yoktur.
- d) $x^2 + x + 3 \equiv 0 \pmod{p}$ denkliğinin çözümü varsa,
 $x^2 + x + 25 \equiv 0 \pmod{p}$ denkliğinin de çözümü vardır.
- e) Hiçbiri

35. $S = \{1, 2, \dots, 32\}$ olmak üzere; S nin hangi k elemanlı A altkümesini alırsak alalım, A kümesinde, a, b yi; b de c yi bölecek şekilde farklı a, b, c sayılarının bulunmasını sağlayan en küçük k değeri nedir?

- a) 29 b) 25 c) 24 d) 17 e) Hiçbiri

36. $x_1 = -1$ ve her n pozitif tam sayısı için $x_{n+1} = (1 + \frac{2}{n})x_n + \frac{4}{n}$ ise, x_{2000} nedir?

- a) 1999999 b) 2000008 c) 2009998 d) 2000998 e) 1999998